




Przygotowanie do kolonoskopii

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA PREPARATEM FORTTRANS

DIETA		Użycie preparatu FORTTRANS
<p>3 dni przed planowanym badaniem</p>	<p><u>Nie należy spożywać:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sałatek jarzynowych • owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek) • pestek siemienia lnianego i maku 	
<p>1 dzień przed planowanym badaniem</p>	<p><u>Można zjeść:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • śniadanie bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych; • zupy w zmiksowanej formie (zupa krem); • kisiel; • budyń; • serki homogenizowane bez dodatków, • inne napoje można pić w dowolnej ilości; 	<p>Około godz. 18.00 zgodnie z instrukcją należy przygotować 3 litry roztworu Fortrans rozpuszczając każdą z 3 torebek w 1 litrze NIEGZOWANEJ wody. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 3 godzin (1 szklanka co 15 minut) Smak roztworu można poprawić sokiem z cytryny. OD CHWILI PICIA FORTTRANSU NIE NALEŻY NIC JEŚĆ !!! Można pić dowolną ilość płynów – herbata, soki, kawa, woda niegazowana.</p>
<p>w dniu badania</p>	<p>NIENALEŻY PRZYJMOWAĆ JAKIKOLWIEK POSIŁKÓW MOŻNA PIĆ WODĘ</p>	<p>Rano o godz. 6.00 należy rozpuścić 1 torebkę (ostatnią) środka FORTTRANSU w 1 litrze wody NIEGAZOWANEJ i wypić w ciągu 1 godziny (1 szklanka co 15 minut).</p> 

Informacje dodatkowe:

- Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną; Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania;
- Przed zastosowaniem preparatu Fortrans prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu;
- Prosimy o zgłoszenie się na badanie z osobą towarzyszącą;
- Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. na nadciśnienie tętnicze, choroby serca padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody;
- Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania;
- Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, simtrom ticlid lub aspiryna, acard, acesan i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; należy to jednak skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zmiana tych leków;
- Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej, kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych oraz aktualnych wyników badań laboratoryjnych;
- Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis;